




NO	薬剤名 効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	寝	注意事項
1	ニフェジピン 10mg 徐放錠		1	2	回	朝	夕	食後に 14日分 全14錠
2	プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」 肝臓のコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させ、血清脂質を改善させます。 通常、高脂血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。		1	1	回	夕	食後に 14日分 全14錠	指示された食事療法や運動療法をきちんと守ってください。
3	カンデサルタンOD錠 12mg 「EE」 血管を収縮して血圧を上げる体内の物質であるアンジオテンシンIの受容体に拮抗し、末梢血管の抵抗を低下させて血圧を下げる薬です。 通常、高血圧症の治療に用いられます。		1	1	回	朝	食後に 14日分 全14錠	血圧が下がりすぎることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高所での作業、車の運転など危険をともなう機械の操作などには十分注意してください。
4	ネシーナ錠 25mg 血糖値を一定に保つ働きをするホルモンであるインクレチンを分解する酵素(DPP-4)を阻害します。 血糖値が高いときにインスリン分泌を促し、グルカゴン分泌を抑制して、血糖コントロールを改善します。 通常、2型糖尿病の治療に用いられます。		1	1	回	朝	食後に 14日分 全14錠	指示された食事療法や運動療法をきちんと守ってください。 低血糖を起こすことがありますので、高所での作業、車の運転など危険をともなう機械の操作などには十分注意してください。また、この薬を飲んでいることをご家族やまわりの方にもお知らせください。 低血糖症状が起こった時には十分量の糖分(砂糖、ブドウ糖、清涼飲料水など)をとるようにしてください。α-グルコシダーゼ阻害剤(ボグリボースやアカルボースなどの糖分
	ます。 通常、2型糖尿病の治療に用いられます。							の吸収を遅らせる薬)と同時に服用中の方は、低血糖症状が起こった時にはブドウ糖をとるようにしてください。

東京都文京区本駒込 2-28-16

医療法人 オルカ医院

電話番号: 03-3946-0001

医師名: 山田 次郎

