

NO	薬剤名 効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	寝	注意事項
1	ニフェジピン 10mg 徐放錠		1日2回朝夕食後に 14日分 全14錠					
2	プラバスタチンNa塩錠 10mg 「タナベ」  肝臓のコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させ、血清脂質を改善させます。 通常、高脂血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。			1日1回夕食後に 14日分 全14錠				
3	カンデサルタンOD錠 12mg 「EE」  血管を収縮して血圧を上げる体内の物質であるアンジオテンシンIの受容体に拮抗し、末梢血管の抵抗を低下させて血圧を下げる薬です。 通常、高血圧症の治療に用いられます。		1日1回朝食後に 14日分 全14錠					
4	ネシーナ錠 25mg  血糖値を一定に保つ働きをするホルモンであるインクレチンを分解する酵素(DPP-4)を阻害します。 血糖値が高いときにインスリン分泌を促し、グルカゴン分泌を抑制して、血糖コントロールを改善します。 通常、2型糖尿病の治療に用いられます。			1日1回朝食後に 14日分 全14錠				
	ます。 通常、2型糖尿病の治療に用いられます。							

